

有害外来植物の特徴・駆除方法

アレチウリ

1 特徴

- ・ウリ科のつる性の1年生草本
- ・茎は粗い毛を密生したつるで、巻きひげで他物に巻き付き広がる
- ・葉は径10～20cm
- ・花の径は約1cmで黄白色
- ・生育場所 河川敷、林縁、畑地、樹園地、路傍等 日当たりのよい肥沃地を好む



2 どんな被害を引き起こすのか

- ・つるを伸ばして他の植物を覆い、日光を遮って駆逐する
- ・河川敷に固有の在来植物の減少を招く

アレチウリとクズの違い
アレチウリは茎から1枚単独
クズの葉は茎から3枚一組

3 発芽・開花・結実の時期

発芽 5月から10月 開花 8月から10月 結実 9月から11月

4 駆除方法

①抜き取り（根絶を目指す 1年草のため根が浅く確実に駆除できる）

- ・スコップ等で根ごと抜き取る
- ・実施時期は、芽生え期から成長初期がよい
- ・年3回以上 6月下旬 7月下旬～8月上旬 9月下旬

②刈り払い（抑える、増やさない 広範囲を防除したい場合に適する）

- ・刈払機等で地上部を刈り取る 開花・結実を抑制できる
- ・年3回以上 結実期前半の9月上旬頃まで